

《心理健康临床症状自评量表（SCL-90）》测评报告书

编号：16210452128	性别：男	年龄：20
姓名：沈 聪	学历：大学本科	出生日期：1997/10/24
所属：	职业：学生	测试日期：2017-12-22 16:31

一、测验简介

SCL-

90由Derogatis在1973年编制, 在国外应用甚广, 80年代引入我国, 并在精神科和心理健康门诊的临床工作中得到广泛应用。心理健康临床症状自评量表包含了90个项目, 它是用来测查人的精神症状及其严重程度和变化情况的量表, 包含了比较广泛的精神症状学内容, 从感觉、情感、思维、意识、行为直至生活习惯、人际关系、饮食等均有涉及, 要求受试者根据自己的实际情况就有无该症状做评定。主要应用于临床研究、心理咨询、精神科门诊, 对有心理症状（即有可能处于心理障碍或心理障碍边缘）的人有良好的区分能力, 适用于测查人群中哪些人可能有心理障碍、某人可能有何种心理障碍及其严重程度如何。该量表测的是个人某段时间内的症状水平, 往往易受生活事件的影响。

临床应用证明, 它的评估具有较高的真实性, 同时与其它自评量表相比, 具有内容大、反应症状丰富, 更能准确刻划病人的自觉症状等优点, 因此是当前心理门诊中应用最多的一种自评量表。

SCL-90有十个分量表, 即所有的90个项目实际上的是十个方面的内容。这十个方面分别是:

- (1) 躯体化: 反映主观的躯体不适感;
- (2) 强迫症状: 反映临床上的强迫症状群;
- (3) 人际关系敏感: 反映个人的不自在感和自卑感;
- (4) 抑郁: 反映与临床上的抑郁症状群相联系的行为表现;
- (5) 焦虑: 反映与临床上焦虑症状相联系的精神症状及体验;
- (6) 敌对: 从思维、情感及行为三个方面反应受试者的敌对表现;
- (7) 恐怖: 反映传统的恐怖状态或恐怖症的内容;
- (8) 偏执: 指猜疑和关系妄想等;
- (9) 精神病性: 反映精神分裂样症状项目;
- (10) 其他: 反应睡眠及饮食情况。

《心理健康临床症状自评量表》适用于具有一定阅读和理解能力的被测试者。主要适用于一般性的神经症、适应障碍及其它轻性精神障碍患者。不适合于鉴别躁狂症和精神分裂症。

SCL-90的施测注意事项

1、向受检者交待清楚评定要求, 告知其所选结果没有对错之分, 让其作出独立的, 不受任何人影响的自我评定。

2、评定的时间范围: 是“现在”或者是“最近1周”的实际感觉。

3、评定结束时, 应检查有无遗漏或重复评定。

二、测评结果

总分: 281
总均分: 3.12


阳性项目数： 80.00
 阴性项目数： 10.00
 阳性症状均分： 27.10

因子分数

躯体化 :1.92 强迫 :3.40 人际关系:4.22 抑郁 :3.46 焦虑 :3.70
 敌对 :3.33 恐怖 :3.00 偏执 :3.67 精神病性:2.50 其他 :2.29

剖析图

因子得分图表



三、分析说明

关于心理健康状况（总分）

大于250分则说明有比较严重的心理问题，需要作医学上的详细检查，很可能要做针对性的心理治疗或在医生的指导下服药。

关于躯体化

被测试者基本不存在躯体化症状。被测试者很少感到身体的某些部位，如心血管、胃肠道、呼吸系统以及头部、脊背、肌肉等有莫名其妙地不舒服的感觉，如感到头晕胸闷，咽部异物感、无力、虚弱、疼痛等问题，这些不适往往无法找到相应的病理原因。被测试者基本上不会为自己的健康问题过度担忧，也不会过分关注自己的身体状况。

关于强迫症状

被测试者在生活中存在强迫性的想法或行为。强迫性的想法或做法是指明知不必要却无法克制地要去想或要去做某事，如反复检查、反复思考某个问题、过分担心、追求完美等。这些强迫性症状在人心理压力较大的时候可能出现。

关于人际关系敏感

被测试者的人际关系较为敏感，在人际交往中自卑感较强，并伴有行为症状（如坐立不安，退缩等）。被测试者在与人交往时过分关注自我形象，过多担心自己是否能让对方喜欢或者接受，无法从与人交往中得到较多快乐和归属的感觉。

关于抑郁

被测试者的抑郁程度较强，对生活缺乏足够的兴趣，缺乏运动活力，极端情况下，可能会有想死的思想或自杀的观念。

关于焦虑

被测试者存在焦虑症状，易表现出烦躁、不安静和神经过敏，极端时可能导致惊恐发作。

关于敌对

被测试者易表现出敌对的思想、情感和行为，好争论，脾气难以控制，不能理智的与人相处。

关于恐怖

被测试者的恐怖症状较为明显，存在对出门旅游、空旷场地、人群聚集的地方或乘坐公共交通工具等日常生活场合感到特别害怕的情况，以及对社交情境的过分恐惧和回避的情况。

关于偏执

被测试者存在偏执症状。被测试者常有偏执的想法和态度（即过分偏激、猜疑、妄想某种关系的存在，把自己私下的低俗想法投射到他人身上、幻想别人的行为都是针对自己、跟自己作对等等）。被测试者不能接纳他人看法和做法，认为自己绝对正确，拒绝听取别人的意见或无理非难他人。

关于精神病性

被测试者存在精神病性症状。被测试者出现或存在幻觉（如凭空听到别人听不到的声音，看到别人看不到的东西，感觉到别人感觉不到的东西）。被测试者有如下精神病性症状：如感到自己很伟大，有特异功能等，或者感到别人可以控制自己、自己的思想别人都可以知道、认为自己罪不可恕或被害妄想等。

四、指导建议

关于心理健康状况（总分）

建议被测试者在日常生活中要积极进取，自强不息，保持良好的社会竞争力，应对当今巨大的社会竞争压力；还要多与人为善，建立起完善的人际网络作为自己心理支持的后盾；此外要注意掌握一些心理保健知识和心理调节技能，注意维护自身心理健康状态的平衡。

关于躯体化

建议被测试者保持积极、乐观的心态和良好的生活习惯，如注意科学饮食，营养均衡，加强体育锻炼，远离烟酒毒品等，也不能忽视到医院做定期体检，长期保持身心的健康状态。

关于强迫症状

建议被测试者保持用自然平和的心态面对生活，保有一颗平常心来面对得失成败，不要对自己和别人要求太高，不苛求完美，保持适当的心理压力水平，这样就比较容易保持健康心态。

关于人际关系敏感

建议被测试者在人际关系中保持乐观开朗、自信达观的心境，多站在对方的角度看问题，扩大或拓深与他人的交往，与别人建立稳固，深层次的关系。这样一方面可以进一步改善、发展被测试者的人际关系；另一方面，被测试者也会感受到自身的价值感和归属感。

关于抑郁

建议被测试者进行进一步的抑郁测查，并进行心理咨询。同时在未来的日子里能够保持开朗、乐观的心态。未来的生活中，挫折和烦恼都是不可避免的，有的时候，即使心态健康的人也会出现暂时的情绪低落，态度消沉，但这并不可怕，只要认识到这种情绪并且恰当地调节好自己的情绪，选择适当的应对方法，就可以从低沉悲观的情绪中走出来，积极地面对生活的挑战。

关于焦虑

建议被测试者进一步进行测查，并寻求心理咨询的帮助，学习一些控制和消除焦虑的方法，如肌肉放松法、深呼吸法等，用以应对突发的压力情境，维持自身心理健康状态。

关于敌对

建议被测试者保持宽容豁达、开朗达观的心态，生活会充满和谐、快乐。

关于恐怖

建议多和人群交流。

关于偏执

建议被测试者能保持用客观、理智的态度对周围的人和事，保持对自己、对世界的信任。同时被测试者要经常与他人交换彼此对事物的看法、意见，了解不同态度存在的必然性，修正自己的一些偏激的看法，使自己更加客观、合理的看待世界。

关于精神病性

建议被测试者进一步进行测查，寻求专业的帮助。

答题情况

被测试者对每个测试题目的具体答案如下：

1. (B)	2. (E)	3. (C)	4. (A)	5. (A)	6. (E)	7. (A)	8. (E)
9. (C)	10. (E)	11. (E)	12. (C)	13. (D)	14. (C)	15. (C)	16. (C)
17. (C)	18. (E)	19. (B)	20. (C)	21. (C)	22. (B)	23. (C)	24. (E)
25. (C)	26. (E)	27. (B)	28. (D)	29. (E)	30. (D)	31. (E)	32. (B)
33. (C)	34. (D)	35. (B)	36. (E)	37. (E)	38. (C)	39. (C)	40. (B)
41. (E)	42. (B)	43. (C)	44. (C)	45. (D)	46. (E)	47. (B)	48. (B)
49. (B)	50. (E)	51. (B)	52. (B)	53. (B)	54. (D)	55. (D)	56. (A)
57. (E)	58. (B)	59. (C)	60. (A)	61. (E)	62. (A)	63. (B)	64. (B)
65. (A)	66. (C)	67. (C)	68. (C)	69. (C)	70. (D)	71. (D)	72. (D)
73. (C)	74. (C)	75. (B)	76. (E)	77. (E)	78. (C)	79. (D)	80. (D)
81. (B)	82. (A)	83. (A)	84. (A)	85. (B)	86. (D)	87. (B)	88. (E)
89. (B)	90. (C)						